



Le progrès, c'est lire un livre et commencer un nouveau chapitre.

GUIDE POUR LES
PATIENTS TRAITÉS PAR
PrCLOZARIL^{MD} (clozapine)

Visitez le
www.clozaril.ca

pour obtenir du soutien
et des renseignements
supplémentaires

Pour vous connecter au site Web, ayez en main
le numéro d'identification du médicament (DIN)
de CLOZARIL^{MD} : 00894745 ou 00894737



CLOZARIL^{MD}
Clozapine

Ressources pour les patients et leur famille

Organismes nationaux

Association canadienne pour la santé mentale, Bureau national

500-250, rue Dundas Ouest
Toronto (ON) M5T 2Z5

Tél. : (416) 646-5557

Courriel : info@cmha.ca

www.cmha.ca/fr/

Société canadienne de la schizophrénie

100-4, rue Fort

Winnipeg (MB) R3C 1C4

Tél. : (204) 786-1616 ou 1-800-263-5545

Télec. : (204) 783-4898

Courriel : info@schizophrenia.ca

www.schizophrenia.ca

Ressources Internet

Société canadienne de la schizophrénie

www.schizophrenia.ca

BC Mental Health & Substance Use Services

www.bcmhsus.ca

(disponible en anglais seulement)

Alberta

Schizophrenia Society of Alberta

Bureau provincial

4809-48^e avenue

Red Deer (AB) T4N 3T2

Tél. : (403) 986-9440

Télé. : (403) 986-9442

Courriel : info@schizophrenia.ab.ca

www.schizophrenia.ab.ca

(disponible en anglais seulement)

Colombie-Britannique

British Columbia Schizophrenia Society

Bureau provincial

1100-1200, 73^e avenue ouest

Vancouver (C.-B.) V6P 6G5

Tél. : (604) 270-7841 ou 1-888-888-0029

Télé. : (604) 270-9861

Courriel : prov@bcss.org

www.bcscs.org

(disponible en anglais seulement)

Manitoba

Manitoba Schizophrenia Society

100-4, rue Fort

Winnipeg (MB) R3C 1C4

Tél. : (204) 786-1616

Télé. : (204) 783-4898

Courriel : info@mss.mb.ca

www.mss.mb.ca

(disponible en anglais seulement)

Nouveau-Brunswick

Schizophrenia Society of New Brunswick

Adresse postale : C.P. 562

Miramichi (N.-B.) E1V 3T7

Adresse civique : 1756, rue Water, bureau 103

Miramichi (N.-B.) E1N 1B5

Tél. : (506) 622-1595 ou 1-877-240-4412

Télé. : (506) 622-8927

Courriel : ssnbmiramichi@nb.aibn.com

www.schizophreniasociety.nb.ca

(disponible en anglais seulement)

Terre-Neuve-et-Labrador

Schizophrenia Society of Newfoundland and Labrador

Bureau principal : 18A-18B UB Waterford Hospital

Rue Waterford Bridge

St. John's (T.-N.-L.) A1E 4J8

Par courrier : 48, rue Kenmount

C.P. 28029

St. John's (T.-N.-L.) A1B 4J8

Tél. : (709) 777-3335

Télé. : (709) 777-3524

Courriel : info@ssnl.org

www.ssnl.org

(disponible en anglais seulement)

Nouvelle-Écosse

Schizophrenia Society of Nova Scotia

5571, rue Cunard, unité 101

Halifax (N.-É.) B3K 1C5

Tél. : (902) 465-2601 ou 1-800-465-2601

Télé. : (902) 465-5479

Courriel : contact@ssns.ca

www.ssns.ca

(disponible en anglais seulement)

Ontario

Schizophrenia Society of Ontario

Bureau provincial à Toronto
95, rue King Est, 3^e étage
Toronto (ON) M5C 1G4

Tél. : 1-800-449-6367

Télééc. : (416) 449-8434

Courriel : info@schizophrenia.on.ca
www.schizophrenia.on.ca
(disponible en anglais seulement)

Île-du-Prince-Édouard

Schizophrenia Society of Prince Edward Island

C.P. 25020
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 9N4

Tél. : (902) 368-5850

Télééc. : (902) 368-5467

Courriel : schizophreniapei@pei.aibn.com

Québec

Société québécoise de la schizophrénie (SQS)

7401, rue Hochelaga
Montréal (QC) H1N 3M5

Tél. : (514) 251-4125 ou 1-866-888-2323

Télééc. : (514) 251-6347

Courriel : info@schizophrenie.qc.ca
www.schizophrenie.qc.ca

AMI-Québec (association anglophone)

5800, boul. Décarie
Montréal (QC) H3X 2J5

Tél. : (514) 486-1448 ou 1-877-303-0264

Courriel : info@amiquebec.org
www.amiquebec.org

Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale

1990, rue Cyrille-Duquet, bureau 203
Québec (QC) G1N 4K8

Tél. : (418) 687-0474 ou 1-800-323-0474

Télééc. : (418) 687-0123

Courriel : info@ffapamm.com
www.ffapamm.com

Saskatchewan

Société de schizophrénie de la Saskatchewan

Bureau provincial
1311 Saskatchewan Drive
Regina (SK) S4P 0C9

Par courrier : Box 305 Station Main

Regina (SK) S4P 3A1

Tél. : (306) 584-2620 ou 1-877-584-2620

Télééc. : (306) 584-0525

Courriel : info@schizophrenia.sk.ca
www.schizophrenia.sk.ca
(disponible en anglais seulement)

Vous êtes admissible au traitement par la clozapine

et on vous a prescrit CLOZARIL^{MD}

Pourquoi mon médecin m'a-t-il prescrit CLOZARIL^{MD}?

Vous êtes admissible au traitement par CLOZARIL^{MD} parce que vous n'avez pas répondu à au moins deux autres antipsychotiques ou parce que vous avez présenté des effets secondaires graves en prenant d'autres antipsychotiques utilisés pour traiter la schizophrénie.

Pendant le traitement par CLOZARIL^{MD}, il est possible que vous ayez des effets secondaires. Veuillez consulter les pages 3 et 4 de cette brochure pour de plus amples renseignements. Le traitement par CLOZARIL^{MD} nécessite d'effectuer des analyses hématologiques régulières pour surveiller un effet secondaire rare (survenant chez environ 0,7 % des patients) qui peut entraîner une diminution du nombre de globules blancs.

Surveillance hématologique

Vous devrez vous soumettre régulièrement à des analyses sanguines tant que vous prendrez CLOZARIL^{MD}.



Votre corps a besoin de globules blancs pour combattre l'infection. CLOZARIL^{MD} peut diminuer le nombre de globules blancs, surtout au cours des 6 premiers mois de traitement. Lorsque le corps ne produit pas suffisamment de globules blancs, une affection grave appelée *agranulocytose* peut se développer. On peut prévenir ou neutraliser cette affection dans la plupart des cas, si elle est détectée assez tôt.

Donc, pendant les 6 premiers mois de traitement, vous devrez subir des tests chaque semaine, puis toutes les 2 semaines pendant les 6 mois suivants, et toutes les 4 semaines après 1 an, selon le jugement de votre médecin.

Surveillance hématologique

Vous soumettre à des analyses sanguines régulières est une condition à respecter pour recevoir votre médicament.



Les pharmaciens font partie de votre équipe soignante et vous délivreront vos comprimés de CLOZARIL^{MD} uniquement si vos analyses sanguines sont à jour. Soumettez-vous régulièrement à des analyses sanguines pour que votre traitement par CLOZARIL^{MD} soit surveillé de façon sécuritaire.

Comment ne pas oublier de faire vos analyses sanguines?

Voici quelques suggestions pour ne pas oublier :

- Consignez toutes les dates de vos analyses sanguines dans un calendrier (compris dans cette brochure), dans un agenda ou dans votre téléphone.
- Présentez-vous au laboratoire le jour de votre rendez-vous chez le médecin pour tout faire en une journée.
- Allez toujours au laboratoire le même jour de la semaine.
- Demandez à un ami ou à un membre de la famille de vous rappeler votre rendez-vous pour l'analyse sanguine.

Parlez sans tarder à un membre de votre équipe soignante dès l'apparition des signes suivants :




Rhume ou symptômes évoquant la grippe, comme un mal de gorge



Fièvre



Anomalie du rythme cardiaque ou accélération persistante des battements du cœur



Tout autre signe d'infection



Essoufflement, enflure des chevilles ou des pieds



Faiblesse, sensation de malaise

Votre médecin pourrait vérifier le nombre de vos globules sanguins et prendre d'autres mesures au besoin. **Ne cessez pas** de prendre votre médicament sans en parler d'abord avec votre médecin.

Prise en charge des effets secondaires

Voici quelques conseils pour vous aider à prendre en charge les effets secondaires que vous pourriez présenter pendant le traitement par CLOZARIL^{MD}.

Effet secondaire	Ce que vous pouvez faire
Constipation	<ul style="list-style-type: none">• Ayez une alimentation riche en fibres comprenant plus de fruits, de légumes et de son.• Buvez beaucoup d'eau.• Faire de l'exercice peut être utile.• Faites attention si vous prenez d'autres médicaments pouvant causer la constipation.• Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Somnolence	<ul style="list-style-type: none">• Abstenez-vous de conduire une automobile ou de faire fonctionner une machine si vous ressentez de la somnolence.• Fractionnez votre dose quotidienne et prenez la fraction principale au coucher†.• La somnolence est pire au début du traitement par CLOZARIL^{MD} et s'atténue généralement au fil du temps. 
Étourdissements	<ul style="list-style-type: none">• CLOZARIL^{MD} peut entraîner une baisse de la pression artérielle, particulièrement au début du traitement, provoquant des étourdissements ou un évanouissement.

† Consultez toujours votre médecin avant d'apporter quelque changement que ce soit à votre traitement médicamenteux.

Ne cessez pas de prendre votre médicament sans en parler d'abord avec votre médecin.

Effet secondaire	Ce que vous pouvez faire
Perte involontaire d'urine la nuit	<ul style="list-style-type: none"> Évitez de consommer du liquide avant le coucher. 
Sialorrhée ou salivation excessive	<ul style="list-style-type: none"> La nuit, placez une serviette douce sur votre oreiller. Le jour, mâchez de la gomme ou sucez de la glace. 
Prise de poids	<ul style="list-style-type: none"> Parlez à votre médecin. Consultez un diététiste à propos de vos habitudes alimentaires. Essayez de manger des aliments sains et d'éviter la malbouffe. Faites davantage d'exercice : par exemple, marchez pour vous rendre à votre rendez-vous ou faites un tour à vélo dans votre quartier. 

Il est recommandé de parler à un diététiste ou à un médecin avant d'apporter des changements à votre alimentation. Consultez votre médecin avant de commencer un programme d'exercices.

Le rôle de votre équipe soignante

Votre équipe soignante doit s'assurer de vous procurer les meilleurs soins possibles tout au long du traitement par CLOZARIL^{MD}. Ceci ne peut être fait qu'avec votre participation étant donné que vous représentez l'élément le plus important dans le processus de votre propre rétablissement. Assurez-vous de faire connaissance avec votre équipe soignante et de découvrir ce que chaque membre peut vous offrir.

- Votre médecin ou votre psychiatre est responsable de la prise en charge globale de votre état et de son évolution. Il veillera à ce que vous entamiez votre traitement par CLOZARIL^{MD}.
- Votre infirmière est disponible pour donner des directives et offrir son soutien pour tout problème vous affectant dans votre vie quotidienne.
- Il revient à votre pharmacien d'exécuter l'ordonnance de CLOZARIL^{MD} et de répondre à vos questions au sujet de ce médicament. Veuillez noter que votre pharmacien a l'autorisation d'exécuter l'ordonnance de CLOZARIL^{MD} à la seule condition d'obtenir les résultats de vos analyses sanguines ou la confirmation qu'elles ont été faites.
- Votre travailleur social pourra vous aider en ce qui concerne vos besoins essentiels ou tout autre service qui vous aidera à fonctionner normalement. Votre médecin ou votre infirmière peut vous mettre en communication avec un travailleur social.
- La collectivité peut proposer des services au patient et à sa famille, notamment un service de consultation et d'éducation. Consultez un membre de votre équipe soignante, les pages jaunes ou Internet pour connaître la clinique communautaire la plus proche. Des ressources supplémentaires sont répertoriées au début de cette brochure.
- Votre famille et vos amis peuvent aussi offrir un précieux soutien.
- Lorsque vous commencerez votre traitement par CLOZARIL^{MD}, vous serez accompagné d'une équipe complète de professionnels de la santé, le Réseau d'assistance et de soutien CLOZARIL^{MD} (RASC^{MD}). Cette dernière travaillera de concert avec l'équipe chargée de votre traitement.

À noter : s'il y a le moindre problème faisant obstacle à votre respect du traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou au personnel infirmier.

Comment le Réseau d'assistance et de soutien de CLOZARIL^{MD} (RASC^{MD}) vous aide

Le RASC^{MD} a été créé pour que des professionnels de la santé (tels que votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière) puissent gérer le risque d'effets indésirables liés à l'emploi de CLOZARIL^{MD}. Le RASC^{MD} permet d'optimiser la communication entre la clinique, le laboratoire et la pharmacie afin de s'assurer qu'on vous prodigue les meilleurs soins lorsque vous prenez CLOZARIL^{MD}.

Le RASC^{MD} participe également à la prise en charge clinique du risque d'agranulocytose (trouble de l'organisme caractérisé par une production insuffisante de globules blancs nécessaires pour combattre les infections), un effet secondaire rare, mais grave.

Pour ce faire, le RASC^{MD} participe à la détection précoce de problèmes afin que cette condition soit décelée le plus rapidement possible, à un moment où elle peut être traitée et résolue.

Le RASC^{MD} est disposé à répondre à toute question provenant de vos professionnels de la santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le RASC^{MD} est au cœur des efforts visant à améliorer la continuité des soins pour les personnes atteintes de schizophrénie réfractaire. Ces efforts vous procurent, ainsi qu'à votre équipe soignante, un vaste éventail de services et de ressources conçus pour optimiser votre traitement, améliorer votre qualité de vie et vous aider à établir et à maintenir des relations satisfaisantes et enrichissantes avec les gens qui vous sont chers.

Conservez cette liste de numéros de

téléphone importants à portée de main au cas où vous auriez besoin de parler à quelqu'un

Nom du médecin _____

Numéro de téléphone _____

Nom du pharmacien _____

Numéro de téléphone _____

Unité de soins infirmiers _____

Numéro de téléphone _____

Travailleur social _____

Numéro de téléphone _____

Groupe de soutien _____

Numéro de téléphone _____

Autre _____

Numéro de téléphone _____

Autre _____

Numéro de téléphone _____

Autre _____

Numéro de téléphone _____

Réponses à certaines questions fréquemment posées à propos du traitement par CLOZARIL^{MD}

Comment dois-je prendre CLOZARIL^{MD}?

C'est le médecin qui décide de la posologie de chaque patient selon la gravité de la maladie. Pour que le traitement soit efficace, il faut suivre à la lettre la posologie prescrite par votre médecin et ne jamais la réduire ni l'augmenter. Si vous croyez que la posologie est trop faible ou trop forte, vous devez consulter votre médecin.

Votre ordonnance sera exécutée pour une, deux ou quatre semaines à la fois.

La première journée de traitement commence habituellement par la prise quotidienne ou biquotidienne de la moitié d'un comprimé de 25 mg. Votre médecin augmentera ensuite la dose graduellement jusqu'à ce que la dose idéale pour vous soit établie. Votre traitement se poursuivra par une dose quotidienne de CLOZARIL^{MD} variant entre 300 et 450 mg. Certains patients peuvent nécessiter des doses allant jusqu'à un maximum de 900 mg par jour.

Pourquoi mon consentement est-il nécessaire à mon médecin?

Le médicament que vous prenez, la clozapine, est produit par plusieurs fournisseurs. Chaque fournisseur se sert de son propre système de surveillance pour assurer la sécurité des patients. Si votre médecin ou votre pharmacien (avec l'approbation de votre médecin) change la marque de la clozapine que vous prenez, votre dossier sera transféré à un système de surveillance différent. Votre médecin doit d'abord en discuter avec vous, et s'il procède au changement, il est très important que votre nouveau fournisseur puisse accéder à vos résultats d'analyses antérieures des globules blancs afin que votre médecin puisse s'assurer que vous êtes adéquatement suivi.

Pour votre sécurité, il est aussi important pour le RASC^{MD} de vérifier, avant le début du traitement, tous les registres portant sur la clozapine afin de s'assurer que vous n'avez pas déjà été traité en raison d'une diminution de vos globules blancs lors de l'administration de la clozapine. Votre consentement est nécessaire pour permettre une telle vérification et assurer la transmission de l'information.

Pourquoi des renseignements personnels, comme mes initiales, ma date de naissance et mon sexe sont-ils recueillis et utilisés aux fins d'identification?

Ces renseignements seront recueillis et serviront à plusieurs fins. Étant donné que ces renseignements vous sont propres, ils permettent de s'assurer que les résultats de vos analyses ne sont pas confondus avec ceux d'une autre personne traitée par le même médicament. De plus, recourir à ces renseignements permet d'éviter le besoin d'utiliser votre nom complet, ce qui accroît la protection de votre vie privée.

Est-ce que mes renseignements personnels peuvent servir à d'autres fins?

Non. Vos renseignements personnels ne sont employés que pour s'assurer que vous faites l'objet d'une surveillance appropriée, peu importe la marque de clozapine que vous prenez.

Que dois-je faire si je déménage ou si je pars en vacances?

Si vous envisagez de déménager ou de partir en vacances, informez votre médecin dès que possible ou au moins deux à trois semaines avant le départ. Votre médecin vous aidera à poursuivre vos analyses sanguines et votre traitement. Le RASC^{MD} peut vous aider à prendre des dispositions pour que vous poursuiviez vos analyses sanguines et continuiez à recevoir votre traitement par CLOZARIL^{MD}. Veuillez communiquer avec nous au 1-800-267-2726.

Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit?

Vos comprimés de CLOZARIL^{MD} doivent être rangés à la température ambiante (15 à 30 °C) dans un endroit sûr hors de la portée et de la vue des enfants.

À noter : ne cessez jamais de prendre CLOZARIL^{MD} sans avoir consulté votre médecin.

Que faire si j'oublie de prendre une dose de CLOZARIL^{MD}?

Si vous oubliez de prendre une dose de CLOZARIL^{MD} et que vous le constatez moins de deux heures après, prenez-la immédiatement. Passé ce délai, ne prenez pas la dose oubliée, puis reprenez votre horaire de dosage habituel. Vous ne devez pas prendre de double dose.

Si vous avez oublié de prendre CLOZARIL^{MD} pendant plus de deux jours, ne recommencez pas à prendre CLOZARIL^{MD}. Vous devez communiquer avec votre médecin, qui vous donnera des directives sur la façon de reprendre le traitement.

Quels sont les effets secondaires possibles de CLOZARIL^{MD}?

Vous devez aviser votre médecin ou votre pharmacien le plus rapidement possible si vous présentez des symptômes imprévus lorsque vous prenez CLOZARIL^{MD}, et ce, même si vous ne croyez pas qu'ils ont un lien avec les médicaments.

Certains effets secondaires peuvent être graves et doivent être immédiatement signalés à votre médecin. D'autres vous forcent à **cesser de prendre CLOZARIL^{MD} et à solliciter un traitement médical d'urgence sur-le-champ.**

Mises en garde et précautions

- Des études menées sur divers médicaments de la famille dont CLOZARIL^{MD} fait partie ont révélé une fréquence accrue de décès lorsqu'ils sont employés chez des patients âgés atteints de démence. CLOZARIL^{MD} n'est pas indiqué chez les patients âgés atteints de démence.
- CLOZARIL^{MD} peut causer une baisse du nombre de globules blancs pouvant mettre la vie du patient en danger (agranulocytose ou granulocytopenie), c'est pourquoi il ne doit pas être employé chez des patients qui présentent des antécédents de trouble de la moelle osseuse. Durant le traitement par CLOZARIL^{MD}, vous devrez vous soumettre régulièrement à des analyses sanguines afin de s'assurer que vous présentez un taux sain de globules blancs. Par conséquent, votre médecin vous inscrira aussi au registre de patients du programme.
- L'emploi de CLOZARIL^{MD} a été associé à des troubles cardiaques possiblement graves (p. ex., myocardite, péricardite, épanchement péricardique et myocardiopathie), c'est pourquoi il ne doit pas être administré aux patients qui présentent des antécédents de maladie cardiaque.

Très fréquent :

- Apparition ou aggravation d'une constipation

Fréquents :

- Tension artérielle basse (faiblesse, étourdissements, évanouissement)
- Taux élevé d'un type particulier de globules blancs, augmentation du nombre de globules blancs
- CLOZARIL^{MD} peut causer une faiblesse musculaire, une somnolence et une baisse de la pression artérielle qui peuvent entraîner une chute et des blessures.
- **Faiblesse soudaine ou engourdissement du visage, des bras ou des jambes et problèmes d'élocution ou de la vue**
- **Rigidité musculaire, forte fièvre, rythme cardiaque irrégulier ou élevé, transpiration, confusion ou diminution de la conscience**
- **Convulsions (perte de conscience avec tremblements incontrôlables)**

Peu fréquents :

Signes d'infection tels que la fièvre, des frissons prononcés, un mal de gorge ou des ulcères dans la bouche (signe d'une diminution du nombre de globules blancs dans le sang menant à une plus grande sensibilité aux infections)

Rares :

- Caillots sanguins : enflure, douleur et rougeur à un bras ou à une jambe pouvant dégager de la chaleur au toucher. Vous pourriez ressentir une douleur soudaine à la poitrine, de la difficulté à respirer ainsi que des palpitations cardiaques
- Douleur à la poitrine causée par l'inflammation du muscle cardiaque ou de la membrane extérieure du cœur
- Aspiration d'aliments dans les poumons
- Douleur abdominale attribuable à l'inflammation du pancréas
- Faible taux de globules rouges
- Trouble du foie : coloration jaune de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit
- Signes d'infection des voies respiratoires ou de pneumonie, tels que de la fièvre, de la toux, de la difficulté à respirer ou une respiration sifflante
- Soif excessive, sécheresse de la bouche et urines abondantes pouvant être des signes d'un taux élevé de sucre dans le sang (diabète)

Très rares :

- ***Douleur thoracique, difficulté à respirer et autres symptômes respiratoires***
- Pouls rapide et irrégulier persistant au repos, accompagné possiblement d'un essoufflement et d'une enflure des pieds ou des jambes
- Saignements spontanés ou ecchymoses (bleus), pouvant être des signes d'une baisse du taux de plaquettes (thrombocytopénie)
- Taux élevé de plaquettes dans le sang
- Altération de l'orientation/confusion, nausées/vomissements, élimination excessive d'urine, douleur abdominale accompagnée d'un taux de sucre élevé dans le sang
- Sensation de malaise, vomissements accompagnés de constipation grave/prolongée
- ***Réaction allergique : enflure, principalement du visage, de la bouche et de la gorge, mais aussi de la langue, qui peut démanger ou devenir douloureuse, et difficulté à respirer***
- Inflammation du rein
- ***Érection persistante (plus de 4 heures) et douloureuse***
- Mort subite inexpiquée

Fréquence inconnue :

Transpiration abondante, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée (symptômes du syndrome cholinergique); crise cardiaque pouvant provoquer la mort; douleur écrasante à la poitrine (signe d'un apport insuffisant de sang et d'oxygène au muscle cardiaque); insuffisance rénale, maladies du foie incluant la stéatose hépatique (excès de gras dans les cellules du foie), la mort des cellules du foie, la toxicité et les lésions hépatiques et les troubles du foie dans lesquels le tissu hépatique normal est remplacé par du tissu cicatriciel, entraînant une perte de fonctionnement du foie, y compris les événements impliquant le foie pouvant avoir des conséquences mettant en danger la vie du patient, comme l'insuffisance hépatique (pouvant entraîner la mort), les lésions hépatiques (lésions touchant les cellules du foie, les canaux biliaires qui se trouvent dans le foie, ou les deux) et la greffe de foie.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de CLOZARIL^{MD}, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets secondaires les plus fréquents sont la somnolence, les étourdissements, un pouls rapide, la constipation et une augmentation de la production de salive. Les autres effets secondaires possibles sont la prise de poids et la rétention urinaire (mictions moins fréquentes). CLOZARIL^{MD} peut entraîner une baisse de la tension artérielle, particulièrement au début du traitement, ce qui peut provoquer des étourdissements ou un évanouissement. Autres effets secondaires possibles : maux de tête, tremblements, comportement répétitif et rituel (symptômes obsessifs compulsifs), pensées obsessionnelles et comportements compulsifs, haute pression, transpiration, troubles de l'élocution (p. ex., bégaiement, langue pâteuse), nausées, vomissements, sécheresse de la bouche; raideurs musculaires; mouvements anormaux, incapacité d'amorcer un mouvement, incapacité de rester immobile, sensation intérieure d'agitation, rigidité des membres, tremblement des mains; vision trouble, difficulté à lire; modification du tracé de l'électrocardiogramme (ECG); taux élevé d'enzymes hépatiques; taux élevé d'enzymes musculaires; confusion; battements cardiaques irréguliers; difficulté à avaler; taux élevé de cholestérol; taux élevé d'acides gras dans le sang; mouvements involontaires et superflus tels que grimaces, claquement des lèvres et clignotement rapide des yeux; enflure des glandes qui se trouvent dans les joues; réactions cutanées; modification des ondes cérébrales à l'électroencéphalogramme (EEG); maux d'estomac, brûlures d'estomac; faiblesse, spasmes et douleurs musculaires; diarrhée, nez bouché, perte involontaire d'urine la nuit; éruptions cutanées, boutons rouge-violacé, démangeaisons; douleur abdominale, fièvre; changement de coloration de la peau; érythème du visage « en papillon », douleur articulaire, douleur musculaire, fièvre et fatigue (lupus érythémateux); augmentation soudaine et incontrôlable de la tension artérielle (pseudophéochromocytome), flexion incontrôlée d'un côté du corps (pleurothotonos), chez les hommes, troubles éjaculatoires causant l'écoulement du sperme dans la vessie plutôt que l'éjaculation par le pénis (orgasme sans éjaculation ou éjaculation rétrograde). Informez votre médecin si une constipation apparaît ou s'aggrave (devient pire). Vous pourriez avoir besoin de laxatifs.

Que dois-je dire à mon médecin avant de prendre CLOZARIL^{MD}?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre CLOZARIL^{MD} si vous : souffrez d'une hypertrophie de la prostate; présentez des antécédents de convulsions (p. ex., épilepsie); êtes atteint de glaucome (trouble oculaire); souffrez de diabète; présentez des facteurs de risque de formation de caillots sanguins (tels que des antécédents familiaux de thrombose [caillots], l'âge supérieur à 65 ans, le tabagisme, l'obésité, une chirurgie majeure récente [p. ex., reconstruction d'une hanche ou d'un genou], l'immobilité causée par un déplacement en avion ou autre, ou la prise de contraceptifs oraux [« la pilule »]); présentez des antécédents de trouble de la moelle osseuse; souffrez d'un iléus paralytique ou d'un autre trouble digestif grave; souffrez de constipation; souffrez ou avez déjà souffert de troubles cardiaques; souffrez de maladie cardiaque ou avez des antécédents familiaux d'anomalie de l'activité électrique du cœur (allongement de l'intervalle QT); avez été victime d'un accident vasculaire cérébral; souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie pulmonaire; êtes atteint de la maladie d'Alzheimer; êtes atteint d'une affection appelée démence; êtes enceinte ou prévoyez le devenir; ou allaitez.

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien de votre consommation de café et lui indiquer si vous fumez. Une modification soudaine de vos habitudes peut avoir une incidence sur l'efficacité de CLOZARIL^{MD}.

Votre médecin doit surveiller votre poids corporel et votre glycémie avant de vous donner un traitement par CLOZARIL^{MD} et aussi longtemps que vous recevez le traitement.

À quel moment dois-je parler à mon médecin au cours du traitement par CLOZARIL^{MD}?

Vous devez signaler sans tarder à votre médecin la survenue d'une tachycardie (accélération du rythme cardiaque) persistante au repos, accompagnée d'autres signes et symptômes d'insuffisance cardiaque (p. ex., une douleur thoracique, un essoufflement, une enflure des chevilles et des pieds ou des arythmies [anomalies du rythme cardiaque]). Vous pouvez également éprouver d'autres symptômes, notamment de la fatigue, des symptômes pseudogrippaux, une fièvre sans autre cause apparente, une hypotension (tension artérielle basse) et (ou) une élévation de la pression veineuse au niveau de la jugulaire (gonflement des veines du cou en position assise ou debout). Communiquez immédiatement avec votre médecin avant de cesser de prendre l'un ou l'autre de vos médicaments.

Les autres médicaments susceptibles de modifier l'effet de CLOZARIL^{MD} comprennent certains antibiotiques, des médicaments servant au traitement de la dépression, de convulsions et des ulcères d'estomac, de même que certains médicaments efficaces contre les infections fongiques et virales et des contraceptifs oraux. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre.

Quand faut-il éviter de prendre CLOZARIL^{MD}?

- Si vous êtes allergique à la clozapine ou à un des ingrédients entrant dans la composition de CLOZARIL^{MD}
- Si vous êtes incapable de subir des analyses sanguines régulières
- Si on a déjà diagnostiqué chez vous un nombre insuffisant de globules blancs, sauf si ce diagnostic a été posé à la suite du traitement d'un cancer
- Si vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie de la moelle osseuse ou d'une maladie touchant la formation des globules sanguins
- Si vous avez des problèmes touchant le foie, les reins ou le cœur (p. ex., myocardite, myocardiopathie ou insuffisance cardiaque)
- Si vous souffrez de convulsions non maîtrisées
- Si vous avez des problèmes d'alcool ou d'abus de médicaments ou de drogues
- Si vous souffrez ou avez déjà souffert de constipation grave, d'occlusion intestinale ou de toute autre affection touchant le gros intestin

Si vous croyez être allergique à CLOZARIL^{MD} (clozapine), demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Puis-je consommer de l'alcool pendant que je prends CLOZARIL^{MD}?

CLOZARIL^{MD} peut intensifier l'effet de l'alcool, des somnifères, des tranquillisants et des médicaments antiallergiques (antihistaminiques). Vous devez informer votre médecin avant de prendre tout autre médicament (y compris ceux pouvant être obtenus sans ordonnance).

Y a-t-il des activités que je dois éviter?

En raison du risque de convulsions durant le traitement par CLOZARIL^{MD}, vous devez éviter les activités au cours desquelles une perte de conscience pourrait mettre votre vie ou celle des autres en danger (p. ex., conduire une automobile, faire fonctionner une machine, nager, grimper). La capacité de votre organisme à réguler sa température peut être affectée; par conséquent, il est conseillé de boire de grandes quantités de liquides et d'éviter les activités ardues en période de chaleur et d'humidité intenses.

Qu'en est-il de la grossesse et de l'allaitement?

CLOZARIL^{MD} ne doit être pris durant la grossesse que sur indication expresse du médecin. Par conséquent, il faut consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Comme CLOZARIL^{MD} peut passer dans le lait maternel, les mères qui prennent CLOZARIL^{MD} ne doivent pas allaiter.

Il arrive que les enfants nés de mères ayant pris CLOZARIL^{MD} durant la grossesse présentent certains symptômes; ceux-ci disparaissent parfois d'eux-mêmes, mais dans certains cas, ils peuvent être graves et nécessiter l'hospitalisation du nouveau-né. Il est donc très important que votre enfant obtienne des soins médicaux d'urgence s'il a de la difficulté à respirer, dort exagérément, a les muscles tendus ou mous (comme une poupée de chiffon), est agité par des tremblements ou a de la difficulté à s'alimenter.

Qui puis-je appeler si j'ai des questions ou des préoccupations?

Si vous avez des questions ou des préoccupations quant à votre traitement par CLOZARIL^{MD}, n'hésitez pas à communiquer avec votre médecin ou un autre membre de votre équipe soignante. Ils s'assureront que vous obtiendrez les soins et le soutien dont vous avez besoin... quand vous en avez besoin.



CLOZARIL, RASC et RASC Portail de soins aux patients + Conception
sont des marques déposées de Novartis AG.

© Droits d'auteur 2018 HLS Therapeutics Inc.

Mai 2018

HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court, Bureau 701
Etobicoke, Ontario M9W 6L2
www.hls therapeutics.com

RASC[®]
☎ **1-800-267-2726**
📞 **1-800-465-1312**

