

Le 20 juillet 2020

Objet : ^{Pr}CLOZARIL^{MD} (clozapine) – Surveillance dans le cadre de la COVID-19, mise à jour sur les recommandations de Santé Canada

Le 20 mars 2020, le programme RASC a annoncé que Santé Canada avait publié des recommandations provisoires susceptibles d'être mises en œuvre par les professionnels de la santé qui prennent en charge des patients traités par ^{Pr}CLOZARIL^{MD}, et que de telles directives seraient révisées dans trois mois, ou plus tôt, le cas échéant.

Aujourd'hui, la pandémie de COVID-19 est toujours au cœur de l'actualité, à l'heure où plusieurs provinces et systèmes de santé entament diverses phases de reprise post-COVID-19.

Aujourd'hui, Santé Canada a fourni au programme RASC les recommandations mises à jour suivantes.

- Aucune nouvelle préoccupation liée à la sécurité n'a été identifiée pour la période allant de la mi-mars à la fin juin 2020.
- Pour l'instant, les paradigmes d'analyses semblent retourner à leur état d'avant la pandémie pour certains patients traités par la clozapine. Néanmoins, il reste énormément d'incertitude quant aux développements futurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi Santé Canada recommande que les patients continuent autant que possible d'être testés afin de déterminer leur formule leucocytaire (FL) et leur nombre absolu de neutrophiles (NAN) selon leur calendrier d'analyses habituel de surveillance hématologique. Les professionnels de la santé doivent continuer à utiliser leur jugement clinique afin d'évaluer les bienfaits et les risques de la poursuite du traitement en l'absence d'analyses en laboratoire.
- Les fournisseurs de soins de santé doivent également communiquer leur décision clinique à leurs patients, en expliquant notamment les risques qui y sont associés, et amorcer les processus comme il convient pour revenir à un calendrier d'analyses normal.
- Si une analyse de laboratoire manque ou est retardée, la raison devrait être correctement documentée. Le programme RASC devrait faire état des raisons à Santé Canada dans un rapport mensuel.
- Ces recommandations pour les analyses sanguines seront réévaluées dans trois mois ou plus tôt.
- Enfin, il est prévu que les exigences relatives à la surveillance hématologique reviendront éventuellement à la normale, bien qu'il reste une incertitude quant à une éventuelle prolongation de la pandémie de COVID-19.

Bien que Santé Canada ait fourni des recommandations qui ont permis le report des analyses de laboratoire pour la clozapine le cas échéant, il est impressionnant que, à ce jour, la grande majorité des patients du RASC aient pu maintenir leurs intervalles d'analyses normaux.

Afin d'aider à soutenir les soins aux patients, HLS Therapeutics a organisé un total de 28 webinaires au cours de cette période de COVID-19, auxquels ont assisté plus de 900 participants, et plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs pris part à ces efforts.

Alors que nous amorçons la phase de rétablissement de la pandémie de COVID-19, l'équipe du RASC et HLS Therapeutics souhaitent féliciter tous les professionnels de la santé pour leurs efforts dévoués au cours de cette période historique.

Le programme RASC^{MD} est fier de faire partie de votre équipe de soins de santé depuis près de 30 ans, et nous continuons d'être présents ici pour vous soutenir.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre infirmière éducatrice RASC^{MD} locale ci-dessous, ou le programme RASC^{MD} au 1 800 267-2726.

Région	Infirmière éducatrice	Numéro de téléphone
Ouest de l'Ontario	Olga Kurylo	416 779-7158
Est de l'Ontario	Sue Swaine	613 720-1131
Ottawa, Ontario	Sarah Marchand-Lacoursière	514 229-5776
Ouest du Québec	Marie-France Sabourin	514 951-4703
Est du Québec	Sophie Ferland	418 563-7938
Provinces de l'Atlantique	Sophie Ferland	418 563-7938
Côte Ouest	Moriah Tate	780 281-1332

Veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales,

Jason A. Gross, Pharm.D.
Vice-président, affaires scientifiques
HLS Therapeutics Inc.
www.hlstherapeutics.com

En accord avec la Direction des produits thérapeutiques et conformément à la monographie, ^{Pr}CLOZARIL^{MD} (clozapine) n'est offert que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution assurant la tenue d'une base de données nationale exclusive à CLOZARIL^{MD}. Le changement de traitement d'un patient ou d'une patiente d'une marque de clozapine à une autre ne doit pas être effectué par un pharmacien à moins qu'il ou elle n'obtienne un nouveau formulaire d'inscription du patient propre au nouveau registre et rempli par le médecin prescripteur¹. Pour plus de renseignements, la monographie du produit est accessible au www.clozaril.ca.

MLR NS 20200706 F COM