
Le 28 janvier 2021

Objet : Pr^{MD} CLOZARIL^{MD} (clozapine) – Surveillance dans le cadre de la COVID-19, mise à jour sur les recommandations de Santé Canada

Aux professionnels de la santé,

Tout au long de 2020, Santé Canada a publié des recommandations provisoires susceptibles d'être mises en œuvre par les professionnels de la santé qui prennent en charge des patients traités par Pr^{MD} CLOZARIL^{MD} pendant la pandémie de COVID-19.

Santé Canada a confirmé que les recommandations précédentes demeurent en vigueur comme indiqué :

Santé Canada a examiné les renseignements présentés sur la clozapine, et aucune nouvelle préoccupation en matière d'innocuité n'a été relevée pour la période de la mi-mars à la fin de novembre 2020. Comme le Canada demeure actuellement dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, Santé Canada reconnaît que l'accès au dépistage pour certains patients demeure un défi constant. Toutefois, Santé Canada recommande que les patients continuent autant que possible d'être testés afin de déterminer leur formule leucocytaire (FL) et leur nombre absolu de neutrophiles (NAN) selon leur calendrier d'analyses habituel de surveillance hématologique. Les professionnels de la santé doivent continuer à utiliser leur jugement clinique afin d'évaluer les bienfaits et les risques de la poursuite du traitement en l'absence d'analyses en laboratoire. Ils doivent également communiquer avec leurs patients au sujet de ces considérations concernant l'innocuité, y compris les risques associés.

Étant donné que le Canada se trouve toujours dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, l'évaluation de la situation actuelle par Santé Canada appuie la prolongation des recommandations actuelles pour six autres mois. Si une analyse de laboratoire manque ou est retardée, la raison devrait être correctement documentée par le programme RASC^{MD} ¹.

Le programme RASC^{MD} utilise désormais le programme RASC^{MD} Pronto^{MC}, qui permet de réaliser une analyse de sang capillaire au point de service, pour aider à simplifier l'accès à la surveillance de routine de la formule leucocytaire chez les patients traités par le CLOZARIL^{MD}. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec RASC^{MD}.

Le programme RASC^{MD} est fier de faire partie de votre équipe de soins de santé depuis près de 30 ans, et nous continuons d'être présents ici pour vous soutenir. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler au numéro ci-dessous l'infirmière éducatrice ou l'infirmier éducateur RASC^{MD} de votre région, ou le programme RASC^{MD} au 1 800 267-2726.

Région	Infirmière éducatrice	Numéro de téléphone
Ouest de l'Ontario	Christopher Komel	647-244-0765
Est de l'Ontario	Sue Swaine	613 720-1131
Ottawa, Ontario	Sarah Marchand-Lacoursière	514 229-5776
Ouest du Québec	Marie-France Sabourin	514 951-4703
Est du Québec	Sophie Ferland	418 563-7938
Région de l'Atlantique	Sophie Ferland	418 563-7938
Côte Ouest	Moriah Tate	780 281-1332

L'équipe du RASC^{MD} et HLS Therapeutics souhaitent féliciter tous les professionnels de la santé pour les efforts soutenus qu'ils ont déployés au cours de cette période historique.

Veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales,



Jason A. Gross, Pharm.D.
Vice-président, Affaires scientifiques
HLS Therapeutics Inc.
www.hlstherapeutics.com

En accord avec la Direction des produits thérapeutiques et conformément à la monographie, P[®]CLOZARIL^{MD} (clozapine) n'est offert que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution assurant la tenue d'une base de données nationale exclusive à CLOZARIL^{MD}. Le changement de traitement d'un patient ou d'une patiente d'une marque de clozapine à une autre ne doit pas être effectué par un pharmacien à moins qu'il ou elle n'obtienne un nouveau formulaire d'inscription du patient propre au nouveau registre et rempli par le médecin prescripteur². Pour plus de renseignements, la monographie du produit est accessible au www.Clozaril.ca.