

Tableau de consultation rapide des données hématologiques^{1†}

Comment le RASC^{MD} définit les résultats associés au NAN[‡] établis en laboratoire

Vert (valeurs normales pour un traitement par la clozapine)

- NAN $\geq 2,0 \times 10^9/L$

- Poursuivre le traitement par CLOZARIL^{MD}
- Surveiller les patients admissibles[§]:
 - chaque semaine pendant les 26 premières semaines
 - toutes les 2 semaines pour les 26 semaines suivantes
 - toutes les 4 semaines après 52 semaines

Alerte Jaune

NAN dans la plage de :

- $1,5 \times 10^9/L \leq \text{NAN} < 2,0 \times 10^9/L$

- Assurer la surveillance hématologique au moins 2 fois par semaine jusqu'à ce que le nombre absolu de neutrophiles (NAN) se stabilisent ou augmentent.
- Poursuivre le traitement par CLOZARIL^{MD}

Alerte Rouge

- NAN $< 1,5 \times 10^9/L$

Il convient d'envisager des mesures d'isolement protectrices si:

- NAN $< 0,5 \times 10^9/L$

En cas de signes d'infection, des cultures appropriées doivent être réalisées et un traitement antibiotique adapté doit être mis en place.

Suspendre immédiatement le traitement par CLOZARIL^{MD} et surveillez le patient de près.

La confirmation des valeurs hématologiques est recommandée dans les 24 heures.

Arrêtez immédiatement le traitement par CLOZARIL^{MD} si les résultats sont confirmés.

Une surveillance sanguine doit être effectuée au moins une fois par semaine après l'arrêt du traitement par la CLOZARIL^{MD} jusqu'à ce que le NAN soit $\geq 2,0 \times 10^9/L$, quelle que soit la cause de l'arrêt du traitement.

Surveiller attentivement toute manifestation de symptômes pseudo-grippaux ou tout autre symptôme pouvant indiquer une infection (p. ex., fièvre, mal de gorge ou tout autre signe d'infection).

Le traitement par CLOZARIL^{MD} ne doit pas être repris.

Un statut d'interdiction de reprise du traitement est immédiatement attribué au profil du patient.

Consulter un hématologue du RASC^{MD}.

Envisager une consultation hématologique avant d'amorcer le traitement par CLOZARIL^{MD} ou pendant celui-ci, au besoin.

Pour toute information supplémentaire concernant les directives hématologiques de CLOZARIL^{MD}, les directives relatives à la neutropénie ethnique bénigne (NEB) ou les directives relatives aux cas spéciaux, veuillez contacter le RASC^{MD} au 1-800-267-2726.

Questions?

N'hésitez pas à nous au contacter :

RASC^{MD}



Téléphone : 1-800-267-2726



Télécopieur : 1-800-465-1312

[†] Veuillez consulter les renseignements posologiques pour obtenir toutes les données relatives à la surveillance hématologique.

[‡] NAN = nombre absolu de polynucléaires neutrophiles; Neutropénie

[§] Le changement d'un schéma posologique hebdomadaire à « une fois toutes les deux semaines », puis à « une fois toutes les quatre semaines » devrait être fondé sur le profil hématologique du patient ainsi que sur le jugement clinique du médecin traitant, et, s'il est considéré approprié, sur l'opinion d'un hématologue consultant et sur la volonté du patient à poursuivre une fréquence de surveillance hématologique donnée. L'évaluation clinique devrait tenir compte des facteurs éventuels qui pourraient associer le patient à un groupe à risque élevé.

CLOZARIL^{MD} (clozapine) en comprimé est indiqué dans le traitement des symptômes de la schizophrénie résistante au traitement.

Veillez consulter la monographie de CLOZARIL^{MD} à l'adresse clozaril.ca/clozaril_monograph pour obtenir des renseignements importants sur :

- Contre-indications chez les patients présentant des troubles myéloprolifératifs, une maladie hépatique active, une dépression grave du système nerveux central ou un état comateux, une maladie rénale ou cardiaque grave (par exemple, une myocardite), un iléus paralytique, une épilepsie non contrôlée, et autres.
- Mises en garde et précautions importantes concernant la neutropénie sévère (agranulocytose), la myocardite et la cardiomyopathie et l'incompétence de la valve mitrale, et l'augmentation de la mortalité chez les patients âgés atteints de démence.
- Conditions d'utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et instructions de dosage.

On peut également obtenir la monographie du produit en composant le 1-800-267-2726.

NAN = nombre absolu de polynucléaires neutrophiles;

Remarque : toutes les numérations cellulaires sont exprimées en unités de 10⁹/L.

Référence:

1. CLOZARIL^{MD} Monographie de Produit, HLS Therapeutics Inc. 31 Mai 2021

CA-CL-00022-FR



HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court, bureau 701
Etobicoke, Ontario M9W 6L2
www.hlstherapeutics.com



CLOZARIL, RASC et RASC Portail de soins aux patients et sa conception sont des marques déposées de Novartis AG.
© Copyright 2022 HLS Therapeutics Inc.
Février 2022

