



Ce guide ne remplace pas les discussions avec votre médecin. Nous vous encourageons fortement à poser toutes vos questions à votre médecin.

HLS Therapeutics Canada inc. n’assume aucune responsabilité quant aux sites Web mentionnés dans ce guide, aux renseignements qui y sont présentés ni aux autres sites Web auxquels ils peuvent être liés.



HLS

HLS Therapeutics inc.
10 Carlson Court, bureau 701
Etobicoke (Ontario) M9W 6L2
www.hlstherapeutics.com



CLOZARIL^{MD} et RASC^{MD} sont des marques déposées de Novartis AG.
Pronto^{MD} est une marque déposée de HLS Therapeutics inc. Tous droits réservés.
© Droit d’auteur 2026 HLS Therapeutics inc.

janvier 2026 CA-CL-00156-FR

INTÉGRER CLOZARIL^{MD} à votre parcours de soins



Ressources pour vous et votre famille

Organismes nationaux

Association canadienne pour la santé mentale, bureau national
250, rue Dundas Ouest, bureau 401
Toronto (Ontario) M5T 2Z5
Tél. : (416) 646-5557
Courriel : info@cmha.ca
www.cmha.ca/fr

Société canadienne de la schizophrénie
103 Harvest Drive
Steinbach (Manitoba) R5G 2C6
Tél. : (204) 223-9158
Pour de l'aide, appeler au : (204) 223-9158
Courriel : chris@schizophrenia.ca
www.schizophrenia.ca

Ressources pour vous et votre famille

Organismes provinciaux

Alberta

Schizophrenia Society of Alberta
Bureau provincial
4809-48^e Avenue
Red Deer (Alberta) T4N 3T2
Tél. : (403) 986-9440
Téléc. : (403) 986-9442
Courriel : info@schizophrenia.ab.ca
www.schizophrenia.ab.ca

Colombie-Britannique

British Columbia Schizophrenia Society
Bureau provincial
1100-1200 West 73^e Avenue
Vancouver (Colombie-Britannique) V6P 6G5
Tél. : (604) 270-7841 ou 1 888 888-0029
Courriel : info@bcss.org
www.bcss.org

BC Mental Health and Substance Use Services
www.bcmhsus.ca

Ontario

Institute for Advancements in Mental Health (IAM)
95 rue King Est, bureau 300
Toronto (Ontario) M5C 1G4
Tél. : (416) 449-6830 ou 1 800 449-6367
Téléc. : (416) 449-8434
https://iamentalhealth.ca

Nouveau-Brunswick

Schizophrenia Society of New Brunswick
Adresse postale : C. P. 562
Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1V 3T7
Adresse civique : 1756, rue Water, bureau 103
Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1N 1B5
Tél. : (506) 622-1595
Téléc. : (506) 352-0180
Courriel : ssnbmiramichi@gmail.com
www.schizophreniasociety.nb.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Schizophrenia Society of Newfoundland and Labrador
Mental Health and Addiction Centre
Bureau : Salle 1A 302, hall d'entrée
Saint-Jean de Terre-Neuve
(Terre-Neuve-et-Labrador)
Adresse postale : 310 Prince Philip Drive
Saint-Jean de Terre-Neuve
(Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 3X5
Tél. : (709) 777-3335
Courriel : SSNL@nlhealthservices.ca
www.ssnl.ca

Nouvelle-Écosse

Hope For Mental Health*
* Anciennement The Schizophrenia Society of Nova Scotia
Case postale 20006
Bureau de poste de détail de Spryfield
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3R 2K9
Tél. : (902) 333-2003
Courriel : Contact@hope4mentalhealth.ca
www.ssns.ca

Île-du-Prince-Édouard

Schizophrenia Society of Prince Edward Island
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 9N4
Tél. : (902) 368-5850
Courriel : schizophreniapei@pei.aibn.com

Québec

Société québécoise de la schizophrénie (SQS)
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1N 3M5
Tél. : (514) 251-4125 ou 1 866 888-2323
Courriel : info@schizophrenie.qc.ca
www.schizophrenie.qc.ca

AMI-Québec (association anglophone)
5800, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H3X 2J5
Tél. : (514) 486-1448 ou 1 877 303-0264
Courriel : reception@amiquebec.org
www.amiquebec.org/francais/

CAP Santé Mentale
219-1990, rue Cyrille-Duquet
Québec (Québec) G1N 4K8
Tél. : (418) 687-0474 ou 1 800 323-0474
Ligne d'écoute : 1 855 272-7837
Courriel : info@capsantementale.ca

Saskatchewan

Schizophrenia Society of Saskatchewan
Bureau provincial
1311 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 0C9
Adresse postale : Case postale 305
succursale Main
Regina, (Saskatchewan) S4P 3A1
Tél. : (306) 584-2620 ou 1 877 584-2620
Téléc. : 1 306 584-0525
Courriel : info@schizophrenia.sk.ca
www.schizophrenia.sk.ca

Bureau de Saskatoon
230 Ave R South, Salles 219 et 220
Saskatoon, (Saskatchewan) S7M 2Z1
Tél. : 1 306 374-2224
Courriel : info@schizophrenia.sk.ca

CLOZARIL^{MD}

et vous

On vous a prescrit CLOZARIL^{MD} pour traiter vos symptômes de la schizophrénie.

CLOZARIL^{MD} est utilisé chez les adultes âgés de plus de 18 ans qui ne répondent pas aux autres médicaments employés aux mêmes fins ou qui éprouvent des effets secondaires importants en les utilisant.

CLOZARIL^{MD} appartient à la classe thérapeutique des antipsychotiques. Les antipsychotiques agissent sur la dopamine et la sérotonine, des substances chimiques présentes dans le cerveau qui assurent la communication entre les cellules nerveuses. On ne sait pas exactement comment agit ce médicament. Il semble toutefois que CLOZARIL^{MD} améliore l'équilibre de la dopamine et de la sérotonine dans l'organisme.

Analyses sanguines

Des analyses sanguines régulières doivent être effectuées pendant toute la durée du traitement par CLOZARIL^{MD}

Votre médecin effectuera des examens avant et pendant votre traitement par CLOZARIL^{MD}. Ces examens comprendront des analyses sanguines afin de surveiller le nombre de globules blancs, le taux de sucre (glycémie) et le taux des différents gras (lipidémie) dans votre organisme, ainsi que le fonctionnement de votre foie. Puisque CLOZARIL^{MD} peut provoquer un gain de poids, votre médecin devra peut-être vous peser régulièrement.

Votre organisme a besoin de globules blancs pour combattre les infections. Dans de rares cas, CLOZARIL^{MD} peut causer une diminution potentiellement fatale du nombre de globules blancs. Il est donc important de procéder régulièrement à des analyses de sang afin de s'assurer que votre organisme produit suffisamment de globules blancs.

Au cours des 26 premières semaines :

Une analyse sanguine devra être effectuée **chaque semaine** – c'est pendant cette période que le risque de baisse du nombre de globules blancs est le plus élevé.

Après 26 semaines :

Vous et votre médecin évalueront la possibilité de faire des analyses de sang **toutes les 2 semaines** pendant les 26 prochaines semaines.

Après 1 an :

Après 52 semaines de traitement continu et dans la mesure où votre état clinique le permet, les analyses de sang pourront être effectuées **toutes les 4 semaines**.



Vous soumettre à des analyses sanguines régulières est une condition pour obtenir votre médicament



Les pharmaciens font partie de votre équipe de soins et peuvent vous remettre des comprimés de CLOZARIL^{MD} seulement si vos analyses sanguines sont à jour. Assurez-vous qu'elles sont effectuées régulièrement pour bien surveiller votre traitement par CLOZARIL^{MD}.

Analyses sanguines

CLOZARIL^{MD} est offert uniquement par l'entremise d'un système de distribution

CLOZARIL^{MD} est offert uniquement par l'entremise d'un réseau de surveillance appelé le Réseau d'assistance et de soutien CLOZARIL^{MD} (RASC^{MD}). Votre médecin pourrait décider de recourir à **RASC^{MD} Pronto^{MD}**, un dispositif permettant d'effectuer des prélèvements sanguins sur le bout d'un doigt lors de vos rendez-vous réguliers chez le médecin.



Si vous avez des questions concernant RASC^{MD} Pronto^{MD}, veuillez consulter votre médecin pour en savoir plus.



Conseils pour vous aider à ne pas oublier vos analyses sanguines

- Notez tous vos rendez-vous pour une analyse sanguine dans un calendrier, dans un agenda ou dans votre téléphone.
- Si votre médecin vous demande d'aller au laboratoire, essayez de vous y rendre le même jour que votre rendez-vous médical. Essayez d'y aller le même jour de la semaine à chaque fois.
- Demandez à un proche de vous rappeler votre rendez-vous pour une analyse sanguine.



Parlez à votre médecin de la possibilité d'utiliser RASC^{MD} Pronto^{MD} pour vos prélèvements sanguins.

Analyses sanguines

Informez votre médecin, infirmière ou pharmacien dès que vous présentez l'un des symptômes suivants :



Rhume




Symptômes apparentés à la grippe



Fièvre



Mal de gorge



Tout autre signe d'infection



Faiblesse

Votre médecin pourrait vérifier votre numération globulaire et prendre les mesures qui s'imposent, au besoin.

Vous ne devez pas cesser subitement de prendre CLOZARIL^{MD}, en raison du risque d'effets indésirables. Au besoin, vous devez discuter avec votre médecin de la façon de cesser graduellement le traitement.



Conseils pour aider à prendre en charge les effets secondaires possibles

Voici quelques conseils pour vous aider à contrer les effets secondaires possibles de CLOZARIL^{MD} :

Effet secondaire	Conseils pratiques
 Constipation	• Adoptez une alimentation riche en fibres, en mangeant plus de fruits, de légumes et de céréales à grains entiers • Buvez beaucoup d'eau • Demeurez physiquement actif • Faites attention si vous prenez d'autres médicaments pouvant causer de la constipation • En cas de constipation, consultez votre médecin, infirmière ou pharmacien
 Fatigue/somnolence et sensation de tête légère/évanouissement	• Évitez d'accomplir des activités au cours desquelles une perte de conscience pourrait mettre votre vie ou celle des autres en danger (p. ex., conduire une automobile, faire fonctionner une machine, nager, grimper, etc.)
 Étourdissements	• CLOZARIL^{MD} peut baisser votre tension artérielle ce qui peut causer une sensation de tête légère ou un évanouissement • Levez-vous lentement si vous êtes en position assise ou couchée • Buvez beaucoup de liquide

N'arrêtez pas de prendre votre médicament sans consulter votre médecin.

Prise en charge des effets secondaires

Consultez votre médecin ou infirmière si vous présentez les effets secondaires suivants, ou tout autre effet secondaire :

Effet secondaire	Conseils pratiques
Incontinence nocturne	• Évitez de boire avant de vous coucher
Salivation accrue	• Couvrez votre oreiller d'une serviette douce avant de dormir • Mâchez de la gomme sans sucre durant le jour
Prise de poids	• Consultez votre médecin • Discutez de vos habitudes alimentaires avec un diététiste* • Essayez de manger sainement et d'éviter la malbouffe • Intégrez plus d'activité physique à votre routine, comme vous rendre à pied à votre rendez-vous médical ou faire une promenade à vélo dans votre quartier*

L'utilisation de CLOZARIL^{MD} peut entraîner d'autres effets secondaires, notamment ceux-ci :

- Maux de tête
- Fièvre
- Confusion
- Vision trouble
- Chutes et fractures
- Congestion nasale
- Sécheresse de la bouche
- Difficulté à avaler
- Transpiration
- Brûlures d'estomac
- Maux d'estomac
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Besoin d'uriner moins fréquent
- Anomalies de l'éjaculation (orgasme sans éjaculation)
- Bégaiement ou trouble de l'élocution
- Pensées et comportements obsessionnels
- Difficulté à lire
- Flexion incontrôlée d'un côté du corps
- Agitation ou incapacité à rester calme
- Faiblesse, raideur ou douleur musculaires
- Douleurs articulaires
- Enflure au niveau des joues
- Éruption cutanée sur le corps ou le visage
- Démangeaisons
- Plaques cutanées décolorées

Lorsque vous prenez CLOZARIL^{MD}, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ici.

* Il est recommandé de consulter un diététiste ou un médecin avant de modifier votre alimentation. Consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme d'exercices.

Le rôle de votre équipe de soins



Votre équipe de soins est là pour s'assurer que vous recevez les soins adéquats tout au long de votre traitement par CLOZARIL^{MD}. N'oubliez pas que vous avez aussi votre mot à dire quant à vos soins de santé. Il est important de poser des questions et d'apprendre à connaître votre équipe de soins et le rôle de chacun de ses membres.

- **Votre prescripteur ou psychiatre** est responsable de la prise en charge globale de votre maladie et de son évolution, ainsi que de la mise en route de votre traitement par CLOZARIL^{MD}.
- **Votre infirmière** est là pour vous conseiller et vous soutenir si des problèmes affectent votre vie au quotidien.
- **Votre pharmacien** a la responsabilité d'exécuter l'ordonnance de CLOZARIL^{MD} et de répondre à vos questions au sujet de la prise de ce médicament. Veuillez noter qu'il ne peut vous remettre CLOZARIL^{MD} que s'il a les résultats de votre analyse sanguine ou la confirmation qu'une telle analyse a été effectuée.
- **Votre travailleur social** peut vous épauler et vous aider à combler certains besoins essentiels ou obtenir d'autres services pour mieux fonctionner. Votre médecin ou votre infirmière peut vous aider à entrer en contact avec un travailleur social.
- Des **services d'éducation et de counseling pour les patients et leurs familles** pourraient être offerts dans votre région. Pour savoir où se trouve le centre de santé communautaire le plus près de vous, informez-vous en ligne ou auprès d'un membre de votre équipe de soins. Vous trouverez aussi d'autres ressources au début de ce guide.
- **Votre famille et vos amis** peuvent aussi vous apporter un soutien précieux.
- Votre ordonnance de CLOZARIL^{MD} est offerte uniquement par l'entremise d'un système de distribution appelé le **Réseau d'assistance et de soutien CLOZARIL^{MD} (RASC^{MD})**, constitué d'une équipe de professionnels de la santé qui travaillera de concert avec votre équipe de soins.

N'oubliez pas : si vous éprouvez des difficultés à suivre votre traitement, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin, infirmière ou pharmacien.



Le rôle de votre équipe de soins

Réseau d'assistance et de soutien CLOZARIL^{MD} (RASC^{MD})

Le RASC^{MD} a été créé pour que des professionnels de la santé (comme votre médecin, infirmière ou pharmacien) vous aide à prendre en charge les risques d'effets indésirables associés à CLOZARIL^{MD}. Le RASC^{MD} permet d'optimiser la communication entre votre clinique, le laboratoire et votre pharmacie afin d'assurer que vous recevez des soins adéquats pendant votre traitement par CLOZARIL^{MD}.

Conservez cette liste d'importants numéros de téléphone à portée de main au cas où vous auriez besoin de parler à quelqu'un

Nom du médecin

Numéro de téléphone

Nom du pharmacien

Numéro de téléphone

Unité de soins infirmiers

Numéro de téléphone

Travailleur social

Numéro de téléphone

Groupe de soutien

Numéro de téléphone

Autre

Numéro de téléphone

Autre

Numéro de téléphone

Réponses à quelques questions fréquentes concernant le traitement par CLOZARIL^{MD}

Comment dois-je prendre CLOZARIL^{MD}?

Prenez ce médicament exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a prescrit. Si vous pensez que la dose est trop faible ou trop forte, vous devez en parler avec votre médecin. Pour ne pas oublier de prendre CLOZARIL^{MD}, essayez de le faire à la même heure chaque jour.

Le traitement débute habituellement avec la moitié d'un comprimé dosé à 25 mg, pris une ou deux fois la première journée. Les comprimés peuvent être avalés entiers ou écrasés. Votre médecin augmentera ensuite la dose progressivement en fonction de la gravité de votre état et de votre tolérance au médicament.

Pourquoi est-ce que mon médecin a besoin de mon consentement?

Le médicament que vous prenez, la clozapine, est produit par plusieurs fournisseurs. Chaque fournisseur a son système de surveillance afin d'assurer la sécurité des patients. Si votre médecin ou votre pharmacien (avec l'autorisation de votre médecin) change la marque de la clozapine que vous prenez, votre dossier sera transféré à un autre système de surveillance. Le consentement accordé à votre médecin permet au fournisseur d'accéder aux résultats des analyses antérieures de vos globules blancs détenus par tout autre fournisseur pour voir si vous avez déjà présenté une baisse de globules blancs pendant votre traitement par la clozapine.

Réponses à quelques questions fréquentes concernant le traitement par CLOZARIL^{MD}

Pourquoi des renseignements personnels, comme mes initiales, ma date de naissance, mon genre et mon numéro de carte d'assurance maladie, sont-ils recueillis et utilisés à des fins d'identification?

Ces renseignements seront recueillis et utilisés pour diverses raisons. Étant donné que ces renseignements vous sont propres, ils aident à assurer qu'il n'y a pas de confusion entre les résultats de vos analyses et ceux d'une autre personne traitée par le même médicament. L'utilisation de ces renseignements évite aussi le besoin d'utiliser votre nom au complet et protège ainsi votre vie privée.

Mes renseignements personnels peuvent-ils être utilisés à d'autres fins?

Non. Vos renseignements personnels ne sont utilisés que pour assurer une surveillance adéquate, peu importe la marque de clozapine que vous prenez.



Que faire si je prévois de déménager ou de partir en vacances?

Si vous envisagez un déménagement ou des vacances, avisez votre médecin dès que possible. Il vous aidera à poursuivre vos analyses sanguines et la prise de votre médicament.



Comment dois-je conserver CLOZARIL^{MD}?

Vous devez conserver vos comprimés CLOZARIL^{MD} dans leur contenant d'origine à la température ambiante (15 à 30 °C), dans un endroit sûr, hors de la portée et de la vue des enfants. N'utilisez pas le médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon.

Réponses à quelques questions fréquentes concernant le traitement par CLOZARIL^{MD}

Que faire si j'oublie de prendre une dose de CLOZARIL^{MD}?

Si vous oubliez de prendre une dose de CLOZARIL^{MD} et que vous constatez votre oubli moins de 2 heures plus tard, prenez la dose aussitôt. Passé ce délai, vous devez sauter cette dose et reprendre votre horaire habituel. Ne prenez pas une double dose.

Si vous ne prenez aucune dose pendant plus de 2 jours, ne recommencez pas à prendre CLOZARIL^{MD}. Communiquez avec votre médecin, qui vous donnera des directives sur la façon de reprendre le traitement.

Que faire si j'ai pris trop de CLOZARIL^{MD}?

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris une trop grande quantité de CLOZARIL^{MD}, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Rappel : n'arrêtez pas de prendre CLOZARIL^{MD} sans consulter votre médecin.



Quelles sont les mises en garde et précautions importantes que je dois connaître à propos de CLOZARIL^{MD}?

CLOZARIL^{MD} peut causer une **neutropénie grave (agranulocytose)**, soit une baisse alarmante du nombre de globules blancs dans le sang, qui peut entraîner une infection grave ou la mort. En raison de ce risque, vous devez vous soumettre à des analyses sanguines sur une base régulière si vous prenez CLOZARIL^{MD}. Votre médecin vous inscrira à un système de surveillance pour s'assurer que vos analyses sanguines sont effectuées régulièrement.

Des troubles cardiaques, dont une myocardite (inflammation du muscle cardiaque), une péricardite (inflammation de la membrane qui enveloppe le cœur) et une cardiomyopathie (maladie touchant le muscle cardiaque) sont survenus chez des personnes prenant CLOZARIL^{MD}. Ces réactions peuvent être mortelles. Si vous pensez avoir un trouble cardiaque, demandez de l'aide médicale sur-le-champ.

Le risque de décès est plus élevé lorsque des médicaments comme CLOZARIL^{MD} sont utilisés par des personnes âgées atteintes de démence. **CLOZARIL^{MD} n'est pas indiqué chez les patients âgés atteints de démence.**

Réponses à quelques questions fréquentes concernant le traitement par CLOZARIL^{MD}

Quels sont les effets secondaires possibles de CLOZARIL^{MD}?

Informez votre médecin ou pharmacien dès que possible si vous ressentez des symptômes inattendus pendant la prise de CLOZARIL^{MD}, même si vous pensez qu'ils n'ont aucun lien avec le médicament.

Certains effets secondaires peuvent s'avérer graves et devraient aussitôt être signalés à votre médecin. D'autres nécessitent ***l'arrêt du traitement par CLOZARIL^{MD} et l'obtention immédiate de soins médicaux d'urgence.***

CLOZARIL^{MD} peut causer des effets secondaires graves, notamment :

- le syndrome malin des neuroleptiques (SMN), un trouble qui touche le système nerveux;
- la dyskinésie tardive, un trouble qui entraîne des mouvements involontaires et qui peut être irréversible;
- des réactions cutanées graves et potentiellement mortelles, comme le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ), la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS) ainsi que la pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG).

Effets secondaires graves associés à CLOZARIL^{MD} et mesures à prendre

Si vous présentez l'un des effets secondaires graves peu fréquents ou très rares énumérés ci-dessous, consultez votre professionnel de la santé en cas de réaction sévère :

Peu fréquent :

- Trouble du foie : jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit

Très rare :

- Thrombocytose (augmentation du nombre de plaquettes dans le sang) : maux de tête, étourdissements ou sensation de tête légère, douleur thoracique, faiblesse, évanouissements, modification temporaire de la vue, engourdissements ou picotements aux mains et aux pieds

Effets secondaires graves associés à CLOZARIL^{MD} et mesures à prendre

Si vous présentez l'un des effets secondaires graves très fréquents, fréquents, peu fréquents, rares ou très rares énumérés ci-dessous, consultez votre professionnel de la santé :

Très fréquent :

- Apparition ou aggravation d'une constipation

Fréquent :

- Éosinophilie (augmentation du nombre de certains globules blancs) : douleur abdominale, éruption cutanée, perte de poids, respiration sifflante
- Hypotension (faible tension artérielle) : étourdissements, évanouissements, sensation de tête légère, vision trouble, nausées, vomissements, fatigue (peuvent se produire lors du passage de la position couchée ou assise à la position debout)

Peu fréquent :

- Signes d'infection : fièvre, frissons prononcés, mal de gorge ou ulcères buccaux (signes d'une diminution du nombre de globules blancs), nausées, vomissements, diarrhée, sensation générale de malaise
- Dyskinésie tardive : contractions musculaires ou mouvements involontaires ou anormaux du visage, de la langue ou de toute autre partie du corps

Rare :

- Anémie (faible taux de globules rouges) : fatigue, pâleur, maux de tête, essoufflement, étourdissements, faiblesse, difficulté à dormir
- Diabète (taux élevé de sucre dans le sang) : soif ou faim excessives, sécheresse de la bouche et émission d'un grand volume d'urine, perte de poids inexpliquée, mauvaise cicatrisation, infections
- Dysphagie : difficulté à avaler pouvant faire en sorte que la nourriture ou les liquides se retrouvent dans les poumons, problèmes relatifs à l'œsophage
- Troubles cardiaques – myocardite et/ou péricardite, cardiomyopathie (inflammation du muscle cardiaque et/ou de la membrane qui enveloppe le cœur; maladie du muscle cardiaque) : battements cardiaques anormaux, douleur thoracique pouvant ressembler à une crise cardiaque, fatigue, fièvre et autres signes d'infection, notamment des maux de tête, des douleurs musculaires, un mal de gorge, de la diarrhée, des éruptions cutanées, de la douleur ou de l'enflure articulaire, une enflure des jambes, de l'essoufflement

Effets secondaires graves associés à CLOZARIL^{MD} et mesures à prendre

- Pancréatite (inflammation du pancréas) : douleur abdominale haute, fièvre, battements cardiaques rapides, nausées, vomissements, sensibilité au toucher de l'abdomen
- Signes d'infection des voies respiratoires ou de pneumonie, tels que de la fièvre, de la toux, de la difficulté à respirer ou une respiration sifflante
- Thromboembolie veineuse (caillot de sang dans une veine ou une artère) : douleur, sensibilité ou enflure d'une jambe ou d'un bras, rougeur ou chaleur cutanées, froideur, picotements ou engourdissements, pâleur, douleur ou spasmes musculaires, faiblesse

Très rare :

- Pouls rapide et irrégulier persistant au repos, accompagné possiblement d'un essoufflement et d'une enflure des pieds ou des jambes
- Sensation de malaise, vomissements accompagnés de constipation sévère ou prolongée
- Hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) : confusion, nausées, vomissements, soif ou faim excessives, émission d'un grand volume d'urine, douleur abdominale, mal de tête, vision trouble, fatigue
- Augmentation du taux sanguin d'enzymes hépatiques : urine foncée, fatigue, perte d'appétit, jaunissement de la peau ou des yeux
- Thrombocytopénie (diminution du nombre de plaquettes dans le sang) : ecchymoses (« bleus ») ou saignements qui durent plus longtemps que d'habitude si vous vous blessez, fatigue, faiblesse

Effets secondaires graves associés à CLOZARIL^{MD} et mesures à prendre

Si vous présentez l'un des graves effets secondaires fréquents, peu fréquents ou très rares énumérés ci-dessous, cessez de prendre CLOZARIL^{MD} et obtenez immédiatement des soins médicaux :

Fréquent :

- Syndrome malin des neuroleptiques (SMN) : raideur ou rigidité musculaires prononcées accompagnées d'une forte fièvre, de battements cardiaques rapides ou irréguliers, de transpiration, de confusion ou d'une diminution de la conscience
- Convulsions : tremblements incontrôlables accompagnés ou non d'une perte de conscience
- Faiblesse soudaine ou engourdissement du visage, des bras ou des jambes, et problèmes d'élocution ou de vision

Peu fréquent :

- Infarctus du myocarde (crise cardiaque) : sensation de pression ou d'oppression entre les omoplates, dans la poitrine, la mâchoire, le bras gauche ou le haut de l'abdomen, essoufflement, étourdissements, fatigue, sensation de tête légère, peau moite, transpiration, indigestion, anxiété, sensation de faiblesse et, parfois, battements cardiaques irréguliers

Très rare :

- Réaction allergique : difficulté à avaler ou à respirer, respiration sifflante, mal de cœur et vomissements, urticaire ou éruption cutanée, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- Néphrite (infection rénale) : douleur pelvienne, douleur ou sensation de brûlure au moment d'uriner, envie fréquente d'uriner, urine trouble, sang ou pus dans l'urine, enflure surtout du visage ou des jambes
- Priapisme : érection persistante (plus de 4 heures) et généralement douloureuse
- Réactions cutanées graves : fièvre, éruption cutanée grave, enflure des ganglions lymphatiques, symptômes pseudogrippaux, ampoules et desquamation dans ou autour de la bouche, du nez, des yeux ou des organes génitaux et se propageant à d'autres régions du corps, jaunissement de la peau ou des yeux, essoufflement, toux sèche, douleur ou gêne thoracique, sensation de soif, mictions moins fréquentes, émission d'un volume d'urine moins grand

Autres renseignements importants

Que dois-je dire à mon médecin, infirmière ou pharmacien avant d'utiliser CLOZARIL^{MD}?

Afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament, parlez à votre équipe de soins de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

- vous faites de la fièvre ou avez une infection;
- vous souffrez d'une hypertrophie de la prostate;
- vous avez des antécédents de convulsions (p. ex., épilepsie);
- vous êtes atteint de glaucome (trouble oculaire);
- vous souffrez de diabète ou avez des antécédents familiaux de diabète;
- vous présentez des facteurs de risque de formation de caillots sanguins, tels que :
 - des antécédents familiaux de thrombose (caillots);
 - un âge supérieur à 65 ans;
 - le tabagisme;
 - l'obésité;
 - une chirurgie majeure récente (p. ex., reconstruction d'une hanche ou d'un genou);
 - l'immobilité causée par un déplacement en avion ou autre;
 - la prise de contraceptifs oraux (« la pilule »);
- vous avez des antécédents de maladie du côlon ou des antécédents de chirurgie abdominale inférieure;
- vous présentez un trouble hépatique préexistant stable;
- vous souffrez de maladie cardiaque ou vous avez des antécédents familiaux d'anomalie de l'activité électrique du cœur (allongement de l'intervalle QT);
- votre tension artérielle est basse (hypotension);
- votre fréquence cardiaque est élevée (tachycardie);
- vous avez déjà subi un accident vasculaire cérébral;
- vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie pulmonaire;
- vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer;
- vous souffrez de démence;
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;
- vous allaitez ou avez l'intention de le faire (vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par CLOZARIL^{MD});
- vous avez des antécédents ou êtes à risque d'apnée du sommeil (un trouble du sommeil marqué par des interruptions de la respiration);
- vous présentez un risque de pneumonie par aspiration.

Autres renseignements importants

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien de votre consommation de café et lui indiquer si vous fumez. Une modification soudaine de ces habitudes peut avoir une incidence sur l'effet de CLOZARIL^{MD}.

Vous devez aussi mentionner à votre médecin, infirmière ou pharmacien tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce. Les produits suivants pourraient interagir avec CLOZARIL^{MD} : la carbamazépine; la phénytoïne; l'oméprazole; la rifampicine; l'érythromycine; la cimétidine; l'acide valproïque; les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques, tels que le fluconazole, le miconazole et le clotrimazole; les médicaments utilisés pour traiter la dépression, tels que la fluvoxamine, la paroxétine, la sertraline, la fluoxétine et le citalopram; la ciprofloxacine; la caféine; le tabac; les narcotiques; les benzodiazépines; la norépinéphrine; l'épinéphrine; les inhibiteurs de la MAO (monoamine-oxydase); les médicaments utilisés pour supprimer la fonction médullaire; les contraceptifs oraux; les médicaments utilisés pour traiter une tension artérielle élevée; les médicaments utilisés pour traiter les allergies; les médicaments utilisés pour traiter les troubles psychotiques; les médicaments causant de la constipation; les anticholinergiques; l'alcool.

Autres renseignements importants

Quand faut-il éviter de prendre CLOZARIL^{MD}?

N'utilisez pas CLOZARIL^{MD} dans les cas suivants :

- Vous êtes allergique à la clozapine ou à tout autre ingrédient de CLOZARIL^{MD};
- Vous êtes incapable de subir des analyses sanguines régulières;
- Vous avez déjà présenté un faible nombre de globules blancs, sauf si c'était après un traitement pour combattre un cancer (chimiothérapie);
- Vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie de la moelle osseuse, ou vous prenez un médicament pour supprimer la fonction médullaire;
- Vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie qui nuit à la formation des cellules sanguines;
- Vous souffrez d'une maladie du foie;
- Vous souffrez d'une maladie du rein ou d'insuffisance rénale;
- Vous présentez un trouble cardiaque, comme une myocardite, une péricardite, une cardiomyopathie ou une insuffisance cardiaque;
- Vous souffrez de dépression grave du système nerveux;
- Vous souffrez de convulsions non maîtrisées;
- Vous souffrez ou avez déjà souffert d'un « iléus paralytique », de constipation grave, d'une obstruction intestinale ou de tout autre trouble touchant le gros intestin.



Autres renseignements importants



Devrais-je éviter certaines activités?

En raison du risque de convulsions durant le traitement par CLOZARIL^{MD}, vous devez éviter les activités au cours desquelles une perte de conscience subite pourrait poser un danger pour vous-même ou pour les autres (p. ex., conduire une voiture, faire fonctionner une machine, nager, grimper).



CLOZARIL^{MD} peut-il avoir des effets sur les nouveau-nés?

Il arrive que les enfants nés de mères ayant pris CLOZARIL^{MD} durant la grossesse présentent certains symptômes; ceux-ci disparaissent parfois d'eux-mêmes, mais, dans certains cas, ils peuvent être graves et nécessiter l'hospitalisation du nouveau-né. Vous devez consulter immédiatement un médecin si votre nouveau-né a de la difficulté à respirer, dort exagérément, a les muscles tendus ou mous (comme une poupée de chiffon), est agité par des tremblements ou a de la difficulté à s'alimenter.



CLOZARIL^{MD} causera-t-il de la somnolence?

CLOZARIL^{MD} peut causer de la somnolence ou des étourdissements et nuire à votre équilibre. Ceci peut augmenter votre risque de chutes, lesquelles pourraient occasionner des fractures ou d'autres blessures, surtout si vous prenez des sédatifs, consommez de l'alcool, êtes âgé ou souffrez d'une maladie entraînant de la faiblesse ou une fragilité.



Avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions ou des inquiétudes?

Si vous avez des questions ou des inquiétudes à propos de votre traitement par CLOZARIL^{MD}, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un autre membre de votre équipe de soins. Ils s'assureront que vous obtiendrez les soins et le soutien dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.